

## 6 有機栽培で使用可能な農薬

資材名	作物名	適用病害虫	使用倍率	使用液量 (10a)	使用時期	使用回数
ポトキラー水和剤	野菜類	灰色かび病 うどんこ病	1000倍	150～300ℓ	発病前 ～発病初期まで	*
ポトピカ水和剤	野菜類	灰色かび病	2000～4000倍	100～300ℓ	発病前 ～発病初期まで	*
	いちご ピーマン	うどんこ病				
バイオキーパー水和剤	馬鈴しょ	軟腐病	1000～2000倍	150～300ℓ	発病前 ～発病初期まで	*
エコメイト	野菜類		500～2000倍			
エコショット	野菜類	灰色かび病	1000～2000 倍	100～300ℓ	収穫前日まで	*
	トマト ミニトマト	葉かび病		200～700ℓ		
	ぶどう かんきつ	灰色かび病			開花期 ～落弁期	
ジーファイン水和剤	野菜類 なすを除く	白さび病	1000倍	150～300ℓ	前日まで	6回 以内
		うどんこ病	750～1000倍			
		軟腐病	1000倍			
	なす	うどんこ病	1000～2000倍			
	馬鈴しょ	疫病	1000倍			
カリグリーン	野菜類	うどんこ病	800～1000倍	100～400ℓ	前日まで	*
		さび病	800倍	150～300ℓ		
	きゅうり	灰色かび病				
	トマト ミニトマト	灰色かび病 葉かび病				

残効は短い。多剤との混用注意。

\* 散布回数に制限はない